

Endo-echoscopie
Via de mond

Endoscopieafdeling

Inleiding

Binnenkort wordt u in ons ziekenhuis verwacht voor een endo- echoscopie.

In deze folder staat dit onderzoek uitgelegd. Bovendien wordt beschreven wat u voorafgaande aan het onderzoek moet doen en laten en hoe u zelf het beste aan het onderzoek kunt meewerken.

Wat is een endo- echoscopie?

Bij een endo- echoscopie brengt de arts een bestuurbare slang (de endoscoop) via de mond in het lichaam. Hierdoor kan hij de binnenkant van slokdarm, maag en alvleesklier onderzoeken. Bij een endo- echoscopie is op het uiteinde van de endoscoop een echoapparaatje geplaatst. Dit apparaatje zendt onhoorbare geluidsgolven uit.

De echo's van deze geluidsgolven weerkaatsen in het lichaam. Na weerkaatsing worden de echo's van de geluidsgolven opgevangen en omgezet in zichtbaar beeld op een monitor. Hierdoor worden inwendige organen en lymfeklieren zichtbaar gemaakt. Tijdens het onderzoek kan er via het holle deel van de scope een naald worden opgevoerd om lichaamsmateriaal af te nemen voor onderzoek.

Het onderzoek vindt plaats op de endoscopieafdeling.

Vorbereiding

Het onderzoek kan alleen plaatsvinden als u nuchter bent. Dit betekent dat u:

- vanaf 24.00 uur de vorige avond niet meer mag eten en/of drinken.
- Vindt het onderzoek na 13.00 uur plaats, dan mag u op de dag van het onderzoek vóór 7.00 uur een licht ontbijt gebruiken (kopje thee en een beschuit).
- Inname van medicatie op de ochtend van het onderzoek met een slokje water is toegestaan.

Als u nog vragen heeft, kunt u deze het beste vóór het onderzoek stellen.

Geneesmiddelen

Hoewel uw medicatielijst bij de polikliniekarts bekend is, vragen wij u een medicatiepaspoort mee te nemen naar het onderzoek. U dient (in overleg met uw polikliniekarts) minimaal 5 dagen voor het onderzoek te stoppen met:

- ascal / carbasalaatcalcium
- pijnstillers zoals ibuprofen, naproxen (prostaglandinesynthetase remmers)
- bloedverdunners (sintrom, marcoumar e.d.)

Hoe vindt het onderzoek plaats?

Voordat het onderzoek begint, zal u worden gevraagd om een eventuele gebitsprothese uit te doen. Om het onderzoek minder onaangenaam te maken, wordt vooraf de keel verdoofd (met een drank en/of een spray). Dit geeft echter wel een vieze smaak en voor uw gevoel zijn uw mond en keel opgezwollen. Tijdens de verdoving en het onderzoek kunt u gewoon blijven ademen. U komt op uw linker zij te liggen op de onderzoekstafel. Tijdens het onderzoek heeft u een bijtring tussen de kaken om de scope te beschermen. Het zuurstofgehalte en uw polsslag worden continu gemeten. Vlak voordat de scope uw keel binnengaat krijgt u via een infuus een slaapverwekkend middel toegediend dat u helpt te ontspannen ("roesje"). Het onderzoek duurt meestal 30 minuten.

Na het onderzoek

Direct na het onderzoek zal de arts die het onderzoek uitvoert u kunnen vertellen wat er gezien is. De definitieve uitslag krijgt u tijdens uw afspraak op de polikliniek.

Mocht er materiaal (weefsel) bij u worden afgenomen dan hoort u de uitslag hiervan tijdens uw afspraak op de polikliniek.

Mogelijke complicaties

Het bij u uitgevoerde onderzoek kent weinig complicaties. In zeer zeldzame gevallen kan een infectie van het aangeprikte weefsel optreden, een beschadiging van de mondkeelholte of slokdarm of een bloeding. Wij willen vragen alert te zijn en **direct** contact met ons op te nemen in geval van:

- koorts (temperatuur meer dan 39 °C) en/of koude rillingen
- kortademigheid
- het opgeven van bloed

- verergering van de bestaande hoestklachten of het ontstaan van hoesten al dan niet in combinatie met het opgeven van slijm
- pijn

U kunt contact opnemen via het nummer dat aan de achterzijde van deze folder staat vermeld. Buiten kantooruren belt u het algemene nummer van het ziekenhuis en vraagt naar de spoedeisende hulp: 076 595 5000

Belangrijk

Het is belangrijk dat u het onderstaande tot 24 uur na het onderzoek opvolgt:

Door het slaapmiddel kunt u tijdelijk vergeetachtig of suf worden.

- Omdat het slaapmiddel de rijvaardigheid beïnvloedt, mag u gedurende deze periode geen auto besturen. U moet dan ook iemand meenemen die u kan begeleiden.
- U mag geen machines bedienen.
- Wij raden u aan in deze periode geen belangrijke beslissingen te nemen.
- U mag geen genotsmiddelen (alcohol) gebruiken.

Wilt u niet vergeten

- Een eventuele aanvraag van de huisarts of specialist mee te nemen.
- Onderstaande vragen te beantwoorden.
- Deze folder mee te nemen op de dag van het onderzoek.

Vragen

- Gebruikt u, normaal gesproken, bloedverdunnende geneesmiddelen zoals aspirine, acetosal, aspirine-achtige pijnstillers (NSAID's), plavix, sintrom (acenocoumarol) of marcoumar (fenprocoumon)?
Ja / Nee
- Heeft u problemen met uw bloedstolling (blauwe plekken, nabloeding bij tandarts etc.)?
Ja / Nee
- Heeft u een afwijking aan uw hart of bloedvaten waardoor u bij ingrepen van te voren antibiotica moet gebruiken?
Ja / Nee
- Bent u drager van een ICD-apparaat (defibrillator) of pacemaker?
Ja / Nee
- Heeft u kwetsbare, niet te verwijderen gebitsdelen (bijvoorbeeld een kroon)?
Ja / Nee

Heeft u nog vragen ?

Aarzel niet en stel uw vragen aan de verpleegkundige van de endoscopiekamer of aan de arts die het onderzoek uitvoert.

Heeft u thuis, voorafgaande aan het onderzoek, nog vragen? Bel dan tijdens kantooruren naar de endoscopieafdeling van de locatie waar het onderzoek plaatsvindt:

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Langendijk en Molengracht: 076 595 3024 |
| <input type="checkbox"/> | Pasteurlaan: 0162 327 051 |

Tot slot

Mocht u verhinderd zijn, wilt u dit dan doorgeven aan de endoscopieafdeling? Wij kunnen uw plaats dan voor een andere patiënt gebruiken!

