

Röntgenonderzoek van de baarmoeder en eileiders

Hystero Salpingo Gram (HSG)

Gynaecologie

Wat is een HSG?

Een HSG is een Hystero (baarmoeder) Salpingo (eileider) Gram (foto). Door middel van een röntgenonderzoek wordt een indruk verkregen van de functie en de doorgankelijkheid van de baarmoeder en de eileiders. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de periode tussen het einde van de menstruatie en de vermoedelijke eisprong.

Hoe verloopt het onderzoek?

Bij dit onderzoek gaat u op een röntgentafel liggen. De gynaecoloog maakt de schede van binnen en van buiten schoon met jodium. Daarna wordt het gebied rondom de schede afgedekt met een steriele, groene doek. Vervolgens brengt hij/zij een 'spreider' in de schede en kijkt naar de baarmoedermond. De baarmoeder wordt met een klemmetje vastgepakt en met jodium gedesinfecteerd. Hierna wordt een slangetje in de baarmoedermond gebracht of vastgezogen. Dit geeft een prikkelend, soms pijnlijk, gevoel. Met behulp van een spuitje wordt nu een röntgencontrastvloeistof via het ingebrachte slangetje in de baarmoeder gespoten.

Wanneer de vloeistof warm is en u zelf ontspannen bent, wordt het onderzoek doorgaans niet als pijnlijk ervaren. Helaas is het niet altijd zo dat u niets van het onderzoek voelt. Na het onderzoek verdwijnt de pijn snel.



De baarmoeder met aan weerszijde de eileiders

Vervolgens kunt u op een televisiescherm een afbeelding van de baarmoeder (zwart) zien verschijnen. Daarna ziet u, aan weerszijde van de baarmoeder, de eileiders zichtbaar worden. Vervolgens loopt de vloeistof over naar de buik. Dit kan weer een prikkelend, soms pijnlijk, gevoel geven.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Na het onderzoek krijgt u gelegenheid om u te wassen. Daarna vertelt de gynaecoloog u de uitslag van het onderzoek. Diezelfde dag kunt u nog last hebben van een gevoelige buik en/of schouderprikkeling (dit is een uitstralende pijn).

Het is mogelijk dat u nog enkele dagen een beetje bloed verliest. Dit komt doordat de baarmoedermond met een klemmetje is vastgepakt. Dit vastpakken kan een klein wondje veroorzaakt hebben dat nog een beetje blijft nabloeden.

Wanneer moet u contact opnemen?

Bij koorts of hevige buikpijn.

U belt de polikliniek fertiliteit. Telefoon: 076 595 1041.

Buiten kantoortijden belt u naar de afdeling gynaecologie. Telefoon: 076 595 2725.

Heeft u nog vragen?

Mocht u verder nog vragen hebben, of u ergens zorgen over maken, dan kunt u daarover te allen tijde praten met uw gynaecoloog.

De polikliniek fertiliteit is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 13.00 uur.

Telefoon: 076 595 1041.

F048p
GYN.029/907.KH.A