

Glucose tolerantietest

Glucose Tolerantietest

Binnenkort wordt u in Amphia verwacht voor de Glucose Tolerantie Test (GTT). In deze folder kunt u lezen wat het onderzoek inhoudt. U hoeft voor dit onderzoek geen afspraak te maken. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Bloedafname locatie Langendijk, Molengracht of Pasteurlaan. De bloedafname is vanaf 7.30 uur open.

Onderzoek

Met behulp van de glucose tolerantietest wordt bekeken of u in staat bent om een extra hoeveelheid glucose (= suiker) goed te verwerken. Loopt de bloedsuiker te hoog op, dan kan er sprake zijn van (zwangerschaps-) diabetes (suikerziekte).

Vorbereiding

U wordt nuchter verwacht. Vanaf 24.00 uur 's nachts mag u niet eten of roken, alleen een beetje water drinken. Vanwege het dag/nacht ritme in glucose tolerantie dient u voor 9.45 uur aanwezig te zijn op de afdeling bloedafname.

Verloop

Bij de start van het onderzoek wordt bloed uit uw arm afgenomen om te bepalen hoe hoog uw bloedsuiker is. Daarna krijgt u een glas suikerwater te drinken. Om het verloop van uw bloedsuikerwaarde te controleren, wordt één en twee uur na het opdrinken van het suikerwater nogmaals bloed uit uw arm geprikt.

U mag niet eten en roken tijdens het onderzoek. Alleen het drinken van water is toegestaan, mits dit beperkt blijft tot één glas.

Duur

Het onderzoek duurt maximaal 2,5 uur. Tijdens het onderzoek blijft u in het ziekenhuis en wordt u gevraagd lichamelijke activiteit zo veel mogelijk te beperken.

Uitslag

Uw verloskundige of specialist bespreekt met u de uitslag bij uw volgende bezoek.

Vragen?

Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met uw verloskundigenpraktijk of polikliniek verloskundige of tijdens kantoortijden met het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium van Amphia (telefoonnummer: (076) 595 30 14).

www.amphia.nl