

Stappenplan voor MRSA kweek thuis

Inleiding

In deze folder leest u hoe u zelf een kweek kunt afnemen om te zien of u de MRSA-bacterie bij u draagt. Hiervoor heeft u verschillende materialen ontvangen. Lees het stappenplan eerst helemaal door, voordat u begint.

Indien u momenteel antibiotica gebruikt, is het niet zinvol om de kweken af te nemen. Neem in dat geval contact op met de afdeling Infectiepreventie van het Amphia Ziekenhuis.

MRSA

Meticilline Resistente *Staphylococcus aureus* (MRSA) is een bacterie die ongevoelig (resistent) is voor veel soorten antibiotica en daardoor moeilijk te bestrijden. MRSA kan voornamelijk infecties veroorzaken bij patiënten met een verminderde weerstand.

Kweek

De benodigdheden zijn:

- Drie steriele verpakkingen met daarin een wattenstokje en een buisje (foto 1).
- Aanvraagformulier MRSA van Microvida.
- Stickers met uw patiëntengegevens inclusief vermelding van 'keel', 'neus' en 'perineum'.
- Retourenvelop met daarin een kartonnen houder, een plastic zakje (safetybag) en een wit absorberend zakje.



Stappenplan

1. Vul de datum van afname in op het aanvraagformulier MRSA van Microvida.
2. Het afnamesysteem bevat een buisje met vloeistof en een wattenstokje.
3. Maak de steriele verpakking open aan de bovenkant (foto 2).
4. Steek het watje in de neus en strijk een aantal keren langs de neusvleugel en in het puntje van de neus (foto 3).
5. Vervolgens het andere neusgat met hetzelfde watje.
6. Haal de dop van het buisje met de vloeistof en zorg dat de vloeistof er niet uit loopt.



Foto 2

7. Stop de wattenstok in de vloeistof en breek de stok af op het aangegeven streepje (foto 4).
8. Schroef de dop terug op het buisje waardoor het wattenstokje in het buisje wordt gekneld.
9. Controleer of het buisje goed dicht is gedraaid en niet lekt.
10. Plak de sticker met uw gegevens en opschrift 'neus' op het buisje.
11. Neem daarna de keelkweek af door met het wattenstokje langs beide amandelen (tonsillen) te strijken (foto 5).



Foto 3

12. Stop de wattenstok in het buisje
13. Plak de sticker met uw gegevens en opschrift 'keel' op het buisje.
14. Neem daarna de perineumkweek af door met het wattenstokje over de huid te strijken tussen de anus en uitwendige geslachtsdelen (foto 6).
15. Plak de sticker met uw patiëntengegevens en opschrift 'perineum' op het buisje.



Foto 4




Foto 6




Foto 5

Belangrijk

Neem contact op met de afdeling Infectiepreventie bij:

- Een wond
- Huidafwijkingen (bijvoorbeeld eczeem)
- Een blaaskatheter
- Ophoesten fluim (sputum)

Inpakken

Zie voor het inpakken van de buizen de gebruiksaanwijzing op de achterzijde van de retourenvelop.

Versturen

De snelste methode is om de retourenvelop af te geven bij de afdeling Bloedafname op alle locaties van Amphia. Ook kunt u de retourenvelop op de post doen, een postzegel is niet nodig.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is na minimaal drie dagen bekend.
De specialist die het onderzoek heeft aangevraagd, ontvangt de uitslag en neemt hierover contact met u op.

Vragen?

Wij helpen u graag. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Infectiepreventie.
Telefoonnummer: (076) 595 31 88.

www.amphia.nl