

## Medicatiegebruik voor het onderzoek

### Allergenen Huidpriktest

#### Inleiding

Binnenkort verwachten wij u op de longfunctieafdeling van Amphia voor één of meerdere longfunctieonderzoeken. Op iedere locatie van ons ziekenhuis worden longfunctieonderzoeken gedaan.

#### Mag u uw medicijnen innemen vóór het onderzoek?

Als het mogelijk is, staakt u het medicijngebruik als de specialist dit aangeeft. U stopt dan volgens het volgende schema.

Antihistaminica: (middel tegen allergie of andere aandoeningen o.a. ook reistabletten)

3 dagen van te voren staken

Merknaam	Generiekennaam
Aerius	Desloratadine
Allerfree, Claritine	Loratadine
Atarax, Hydroxyzine	Hydroxyzine
Cinnipirine, Cinnarizine, Primatour	Cinnarizine
Marzine, Cyclizine, Primatour	Cyclizine
Dramamine	Dimenhydrinaat
Emesafene	Meclozine/Pyridoxine
Incidal, Mebhydroline	Mebhydroline
Fenistil	Dimetindeen
Kestine	Ebastine
Ketotifen, Zaditen	Ketotifen
Periactin	Cyproheptadine
Phenergan, Promethazine	Promethazine
Polaramine	Dexchlorfeniramine
Reactine, Zyrtec, Revalintabs	Cetirizine
Semprex	Acrivastine
Suprimal	Meclozine
Tavegil	Clemastine
Telfast	Fexofenadine
Triludan, TriludanForte	Terfenadine
Xyzal	Levocetirizine
Nedeltran	Alimenazine
Mizollen	Mizolastine
Tinset	Oxatomide
Rupafin	Rupatadine

Orale corticosteroiden:(ontstekingsremmende middelen) 1 week van te voren staken

Merknaam	Generiekennaam
Albicort	Triamcinolonacetonide
Celestone	Betamethason Cortison
Decadron	Dexamethason
Depo-Medrol	Betamethason
Di-Adreson	Prednisolon
Hydro-Adreson, Hydrocortison	Hydrocortison
Ledercort	Triamcinolon

### Vragen?

Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist.

Longfunctieafdeling:

Locatie Molengracht West 52. wachtkamer 1  
T (076) 595 30 30

Locatie Pasteurlaan, Functieafdeling 52  
T (0162) 32 70 53