

## Endo-echoscopie via oraal

### Inleiding

Binnenkort wordt u in ons ziekenhuis verwacht voor een endo- echoscopie.

In deze folder staat dit onderzoek uitgelegd.

Bovendien wordt beschreven wat u voorafgaande aan het onderzoek moet doen en laten en hoe u zelf het beste aan het onderzoek kunt meewerken.

### Wat is een endo- echoscopie?

Door middel van een endo-echoscoop (een bestuurbare flexibele slang) wordt het slijmvlies (de binnenbekleding) van uw slokdarm, maag en twaalfvingerige darm bekeken. Op deze endo-echo scoop is op het uiteinde van de scoop een echoapparaatje geplaatst. Dit apparaatje zendt onhoorbare geluidsgolven uit.

De echo's van deze geluidsgolven weerkaatsen in het lichaam. Na weerkaatsing worden de echo's van de geluidsgolven opgevangen en omgezet in zichtbaar beeld op een monitor. Hierdoor worden inwendige organen (alvleesklier) en lymfeklieren zichtbaar gemaakt. Tijdens het onderzoek kan er via het holle deel van de scoop een naald worden opgevoerd om lichaamsmateriaal af te nemen voor onderzoek.

Het onderzoek vindt plaats onder een roesje op het Endoscopiecentrum.

### Vorbereiding

Het onderzoek kan alleen plaatsvinden als u nuchter bent. Dit betekent dat u:

- Vanaf 24.00 uur de vorige avond niet meer mag eten en/of drinken.
- Vindt het onderzoek na 13.00 uur plaats, dan mag u op de dag van het onderzoek vóór 7.00 uur een licht ontbijt gebruiken (kopje thee en een beschuit).
- Inname van medicatie op de ochtend van het onderzoek met een slokje water is toegestaan.

Als u nog vragen heeft, kunt u deze het beste vóór het onderzoek stellen.

### Een 'roesje'

Een roesje is een slaapmiddel. U bent zich hierdoor minder bewust van de dingen die er om u heen gebeuren. Het is geen narcose.

Als de arts met u een roesje heeft afgesproken dan moet u voor het onderzoek worden opgenomen in het ziekenhuis (meestal op de dagbehandeling) en na het onderzoek nog 1 à 2 uur blijven.

*U mag na een 'roesje' alleen onder begeleiding van een volwassene naar huis. Hij of zij haalt u op bij de dagbehandeling en zorgt ervoor dat u veilig thuiskomt.*

*U kunt zelf 24 uur niet deelnemen aan het verkeer.*

*Ook kunt u zonder begeleiding van een volwassene niet gebruik maken van het openbaar vervoer of taxi.*

*Indien dit niet geregeld is, kan het onderzoek niet plaatsvinden.*

### Het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij het Endoscopiecentrum. U wordt opgenomen op de dagbehandeling. Een verpleegkundige bereidt u daar voor op het onderzoek en geeft u een infuusnaaldje. Als u aan de beurt bent wordt u opgehaald door de endoscopie-assistent en naar de onderzoekskamer gebracht.

### Geneesmiddelen

Hoewel uw medicatielijst bij de polikliniekarts bekend is, vragen wij u een medicatiepaspoort mee te nemen naar het onderzoek. U dient (in overleg met uw polikliniekarts) minimaal 5 dagen voor het onderzoek te stoppen met:

- ascal / carbasalaatcalcium
- pijnstillers zoals ibuprofen, naproxen (prostaglandinesynthetase remmers)
- bloedverdunners (sintrom, marcoumar e.d.)

**Het onderzoek**

Voordat het onderzoek begint, zal u worden gevraagd om een eventuele gebitsprothese uit te doen. Om het onderzoek minder onaangenaam te maken, wordt vooraf de keel verdoofd (met een drank en/of een spray). Dit geeft echter wel een vieze smaak en voor uw gevoel zijn uw mond en keel opgezwollen. Tijdens de verdoving en het onderzoek is het belangrijk dat u rustig blijft ademen. U komt op uw linker zij te liggen op de onderzoekstafel.

Gedurende het onderzoek krijgt u een ring tussen uw kaken om de scoop te beschermen. Met het onderzoek ligt u op uw linkerszij. Via het infuus krijgt u nu het roesje toegediend. Dit slaapmiddel kan uw bewustzijn, uw reactievermogen en uw ademhaling beïnvloeden daarom wordt uw hartslag, zuurstofgehalte in het bloed en de bloeddruk gecontroleerd. De arts brengt de gastroscopie in uw keel en vraagt u te slikken. Via uw slokdarm gaat de scoop naar uw maag. Nu kan de arts via de echobeelden zien of er afwijkingen zijn aan organen en lymfeklieren. Als dat nodig is wordt er weefsel afgenomen voor onderzoek.

Het onderzoek duurt meestal 60 minuten.

**Na het onderzoek**

Direct na het onderzoek zal de arts die het onderzoek uitvoert u kunnen vertellen wat er gezien is. De definitieve uitslag krijgt u tijdens uw afspraak op de polikliniek.

Mocht er materiaal (weefsel) bij u worden afgenomen dan hoort u de uitslag hiervan tijdens uw afspraak op de polikliniek.

**Mogelijke complicaties**

Het bij u uitgevoerde onderzoek kent weinig complicaties. In zeer zeldzame gevallen kan een infectie van het aangeprikte weefsel optreden, een beschadiging van de mondkeelholte of slokdarm of een bloeding.

Wij willen vragen alert te zijn en **direct** contact met ons op te nemen in geval van:

- koorts (temperatuur meer dan 39 °C) en/of koude rillingen
- kortademigheid
- het opgeven van bloed
- verergering van de bestaande hoestklachten of het ontstaan van hoesten al dan niet in combinatie met het opgeven van slijm
- pijn

U kunt contact opnemen met het endoscopiecentrum,

telefoonnummer: 076-595 5071

Buiten kantooruren belt u het algemene nummer van het ziekenhuis en vraagt naar de Spoedeisende Hulp: (076) 595 50 00.

**Belangrijk**

*Het is belangrijk dat u het onderstaande tot 24 uur na het onderzoek opvolgt:*

Door het slaapmiddel kunt u tijdelijk vergeetachtig of suf worden.

- Omdat het slaapmiddel de rijvaardigheid beïnvloedt, mag u gedurende deze periode geen auto besturen. U moet dan ook iemand meenemen die u kan begeleiden.
- U mag geen machines bedienen.
- Wij raden u aan in deze periode geen belangrijke beslissingen te nemen.
- U mag geen alcohol gebruiken.

**Wilt u niet vergeten:**

- Een eventuele aanvraag van de huisarts of specialist mee te nemen.
- De vragen op deze pagina te beantwoorden.
- Deze folder mee te nemen op de dag van het onderzoek.

Mocht u verhinderd zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan het Endoscopiecentrum? Wij kunnen uw plaats dan voor een andere patiënt gebruiken!

**Vragen?**

Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist.

Endoscopiecentrum:

Molengracht: T (076) 595 30 24
-----------------------------------

[www.amphia.nl](http://www.amphia.nl)

**Vragen**

- |  |          |
|--|----------|
| • Gebruikt u, normaal gesproken, bloedverdunnende geneesmiddelen zoals aspirine, acetosal, aspirine-achtige pijnstillers (NSAID's), plavix, sintrom (acenocoumarol) of marcoumar (fenprocoumon)? | Ja / Nee |
| • Heeft u problemen met uw bloedstolling (blauwe plekken, nabloeding bij de tandarts etcetera)?  | Ja / Nee |
| • Heeft u een afwijking aan uw hart of bloedvaten waardoor u bij ingrepen van te voren antibiotica moet gebruiken?   | Ja / Nee |
| • Bent u drager van een ICD-apparaat (defibrillator) of pacemaker?   | Ja / Nee |
| • Heeft u kwetsbare, niet te verwijderen gebitsdelen (bijvoorbeeld een kroon)?   | Ja / Nee |