

Behandeling plexus coeliacus of nervus splanchnicus

Pijnbehandelcentrum

U bent verwezen naar het Pijnbehandelcentrum in verband met pijnklachten in uw bovenbuik. Deze klachten worden veroorzaakt door ontstekingen of tumoren van een of meer organen. De pijnspecialist heeft met u gesproken over een behandeling van de plexus coeliacus of de nervus splanchnicus. Het doel van deze behandelingen is het verminderen van pijn in de bovenbuik, uitstralend naar de rug.

In deze folder leest u meer over de voorbereiding, uitvoering en de resultaten van een behandeling van de plexus coeliacus of nervus splanchnicus.

Wat is een behandeling van de plexus coeliacus of nervus splanchnicus?

Een behandeling van de plexus coeliacus of de nervus splanchnicus kan zinvol zijn bij pijnklachten van organen in de bovenbuik, zoals de alvleesklier, de maag en de lever of bij een alvleesklierontsteking.

De plexus coeliacus is een zenuwnetwerk in de bovenbuik, aan de voorzijde van de wervelkolom. Dit netwerk speelt een rol bij pijnklachten vanuit de ingewanden. De nervus splanchnicus major is een grote zenuw die naar dit netwerk toeloopt. Zowel het zenuwnetwerk als deze grote zenuw kan uw pijnspecialist behandelen. Hij beïnvloedt de pijnsignalen die de zenuwen afgeven aan de hersenen, waardoor de pijn kan verminderen. Dit kan door het inspuiten van medicatie of door behandeling met een gepulseerde (in golfjes) radiofrequente stroom.

Hoe lang de behandeling werkt, is bij iedereen verschillend. Dat is moeilijk te voorspellen.

De voorbereiding

Uw pijnspecialist beoordeelt of u in aanmerking komt voor een behandeling van de plexus coeliacus of plexus splanchnicus. Als u beiden achter de gekozen behandeling staat, wordt u aangemeld voor deze behandeling.

Bent u al opgenomen in het ziekenhuis, dan wordt u kortdurend overgeplaatst naar de verpleegafdeling van het Pijnbehandelcentrum in Oosterhout. Dit gebeurt per ambulance.

Als u van thuis komt, dan neemt de afdeling Opname voorafgaand aan de ingreep contact met u op over: de geplande datum, informatie over nuchter blijven, uw medicijnen en de afdeling waar u zich mag melden.

Belangrijk

- Gebruikt u bloedverdünnende medicijnen, meld dit dan aan uw behandelend specialist. Hij bespreekt met u of, en wanneer u moet stoppen met deze medicijnen.
- Uw andere medicijnen mag u blijven gebruiken zoals u gewend bent. Dit geldt ook voor uw pijnmedicatie.
- De griepvaccinatie mag niet plaatsvinden twee dagen voor en twee dagen na de behandeling. Andere vaccinaties, zoals reisvaccinaties, mogen niet plaats vinden twee weken voor en twee weken na de behandeling.

De opname

U wordt voor de behandeling opgenomen op de afdeling dagbehandeling. Hier krijgt u een kort opnamegesprek. Vervolgens wordt u in een bed naar de operatiekamer gebracht. U draagt daarbij een operatiehesje. Op de operatiekamer krijgt u een infuus om u medicijnen te kunnen geven indien dat nodig is. De behandeling duurt ongeveer dertig minuten. De totale opname duurt ongeveer 2,5 uur. De behandeling vindt plaats op de operatiekamer van het Pijnbehandelcentrum.

De uitvoering

Tijdens de behandeling ligt u op uw buik op de behandeltafel. U krijgt een plaatselijke verdoving. Vervolgens plaatst de pijnspecialist twee naalden in de rug, via de zijkant van de wervelkolom. Om de juiste positie van de naald te bepalen, maakt hij gebruik van röntgenopnames tijdens het prikken. Zo nodig wordt ook contrastvloeistof gebruikt.

Is de positie goed, dan spuit hij via de naald de medicijnen in rondom het zenuwnetwerk of de splanchnicus-zenuw. Daarnaast kan uw pijnspecialist de naald verwarmen door middel van radiofrequente stroom. Dit gebeurt altijd onder lokale verdoving en is niet pijnlijk.

Na de behandeling

Na de behandeling gaat u kortdurend naar de uitslaapkamer en vervolgens naar de afdeling. Meestal kunt u dezelfde dag weer naar huis. Soms is het nodig om één nacht in het ziekenhuis door te brengen. Was u al opgenomen, dan wordt u dezelfde dag weer per ambulance teruggebracht naar uw afdeling.

De pleister op de prikplaats mag u de dag na de behandeling verwijderen. U mag dan ook weer douchen. Bent u gestopt met bloedverdunders, dan begint u weer op de avond van de behandeling.

Het resultaat

Het resultaat is een dag na de ingreep merkbaar. Soms zelfs al eerder. Afhankelijk van het effect zal de pijnspecialist uw pijnmedicatie aanpassen.

Na ongeveer een week komt u terug op de pijnpolikliniek of wordt u gebeld om het effect van de behandeling met u te bespreken. Ook kan het zijn dat u wordt terugverwezen naar uw oorspronkelijke behandelaar, zoals internist of oncoloog.

Verblijft u nog in het ziekenhuis, dan komt een verpleegkundig pijnconsulent bij u langs u om samen met u het effect te bespreken.

Bijwerkingen

De behandeling kan, ondanks onze zorgvuldige uitvoering, een aantal complicaties met zich meebrengen:

- U kunt last krijgen van napijn. Deze kan enkele weken aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens bijsluiter). Zo nodig kan, in overleg met uw pijnspecialist of huisarts, een andere pijnstiller worden voorgeschreven.
- Allergische reactie op een van de gebruikte middelen. U kunt dan tot twee dagen na de behandeling last kunt krijgen van jeuk, huiduitslag en mogelijke kortademigheid. Waarschuw in dit geval uw huisarts. Hij kan beoordelen welke behandeling noodzakelijk is.
- Krijgt u koorts, waarschuw dan uw pijnspecialist of huisarts.
- Diarree. Dit is een tijdelijke, vaak voorkomende bijwerking.
- Bloeddruk daling. Deze bijwerking treedt in sommige gevallen op en is goed te behandelen op de uitslaapkamer. U kunt ook in de eerste weken na de behandeling wat duizelig worden als u plotseling overeind komt of opstaat door een wat lagere bloeddruk. Dit hoeft niet behandeld te worden, maar bent u hier wel alert op om vallen te voorkomen.

Leefregels

Na een succesvolle behandeling is het mogelijk om uw pijnmedicatie af te bouwen. U heeft dan mogelijk ook minder last van bijwerkingen van deze medicijnen, zoals obstipatieklachten, sufheid enzovoort.

Contact

Het Pijnbehandelcentrum is geopend van maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 16.30 uur.

Vragen over uw pijnbehandeling kunt u die stellen op **het verpleegkundig telefonisch spreekuur** van 10.45 tot 11.45 uur, op telefoonnummer: [0162] 32 70 40.

Voor vragen over uw opname neemt u contact op met de Afdeling Opname, maandag tot en met vrijdag, van 8.30 tot 16.30 uur, op telefoonnummer: [076] 595 30 84.

Amphia
Pijnbehandelcentrum
Pasteurlaan 9
4901 DH Oosterhout