

Littekencorrectie

Inleiding

Bij beschadiging van de huid van het menselijk lichaam als gevolg van een operatieve behandeling, een ongeval of een brandwond kan littekenvorming optreden. Elke wond die geneest, geneest met littekenvorming.

Littekens kunnen fraai genezen en weinig opvallend zijn, maar soms kunnen ze ook opvallen en ontsierend zijn. In deze folder leest u meer over littekenvorming en de mogelijkheden van littekencorrectie.

Wat is littekenvorming?

Littekens kunnen dik (hypertrofisch) worden of zelfs buiten de begrenzing van het oorspronkelijke litteken gaan groeien en wild vlees geven (keloid). Deze overmatige littekenvorming wordt vaker gezien bij mensen met een donkere huidskleur of een hele lichte rossige huidskleur. Bepaalde lichaamsdelen zoals de schouders en het borstbeen geven een verhoogde kans op littekenvorming dan elders op het lichaam.

Een andere factor die een litteken kan beïnvloeden is de richting van het litteken ten opzichte van de huidspanningslijnen. Deze lijnen kunt u in het gelaat zichtbaar maken door het aanspannen van de gelaatsspieren.

Verder zal het duidelijk zijn dat een wond gemaakt door een scherp mes 'mooiere littekens' geeft dan bijvoorbeeld een scheurwond. Een verhoogde spanning op de wond bij sluiten geeft vaak een breed litteken. Het blijkt dat jonge mensen en kinderen door de hogere huidspanning meer kans hebben op littekenvorming dan oudere mensen.

Wat is littekencorrectie?

Bij een littekencorrectie tracht men de vorm van het litteken te verbeteren door een chirurgische ingreep. Deze kan bestaan uit het verwijderen van het litteken en de wond opnieuw sluiten.

Ook kan de ligging of de lengte van het litteken aangepast worden. Belangrijk is dat een littekencorrectie een litteken minder opvallend maakt, maar dat het litteken nooit zal verdwijnen.

Andere behandelmethoden

Behoudens een chirurgische ingreep bestaan er ook andere methoden om dikke littekens te behandelen, zoals injecties met corticosteroïden, druktherapie, siliconenfilm, bestraling of cryotherapie. Bij deze laatste behandelingen kunnen de klachten van een dik litteken verminderen, maar een en ander heeft geen invloed op de breedte van het litteken. Ook bij deze methoden zal het litteken nooit verdwijnen.

Resultaten

Ook al wordt een littekencorrectie met de grootste zorg uitgevoerd, het uiteindelijke resultaat kan niet worden gegarandeerd. Na de littekencorrectie zal men er rekening mee moeten houden dat de littekens langere tijd dik, rood, jeukend en zelfs pijnlijk kunnen zijn. Sommige littekens worden op den duur breder dan men had verwacht.

Risico's en complicaties

Complicaties kunnen altijd optreden, zoals narcoseproblemen, trombosebeen, infectie, bloeduitstorting, weefselversterf, gevoelloze huid etcetera.

Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties is niet te garanderen. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende operatie kan extra kosten met zich meebrengen die of door uw verzekering vergoed moeten worden of door u zelf.

Raadpleeg uw arts

Deze folder is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. De informatie uit deze folder kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie. Hebt u na het lezen van de folder vragen, stel ze dan aan de plastisch chirurg. Het kan handig zijn om uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Bereikbaarheid polikliniek plastische chirurgie

De plastische chirurgie van Amphia is geconcentreerd op de locatie Langendijk.

- Polikliniek en afspraken
T (076) 595 24 59
b.g.g. T (076) 595 10 43
- Secretariaat
T (076) 595 10 43
b.g.g. T(076) 595 24 59

www.amphia.nl