

Infiltratie van een gewricht

Radiologie

Waarom deze behandeling?

U krijgt binnenkort een behandeling van één van uw gewrichten (infiltratie). Dit is besproken met uw behandelend arts. Deze behandeling verrichten we om klachten aan het gewricht te verhelpen zonder dat u daarvoor een operatie hoeft te ondergaan. De radioloog voert de infiltratie uit, geassisteerd door een radiodiagnostisch laborant.

De behandeling

De radiodiagnostisch laborant vraagt u het te onderzoeken lichaamsdeel te ontbloten. Tijdens de infiltratie ligt u op een onderzoekstafel. Eerst wordt de huid ontsmet. Daarna bepaalt de radioloog de plaats waar de medicatie in het gewricht moet worden toegediend. Dit doet hij met behulp van een röntgenapparaat of echoapparaat. Via een naaldje spuit hij de vloeibare medicatie in het gewricht. Meestal bestaat de medicatie uit een mengsel van een pijnstillertje (bupivacaine) en een ontstekingsremmer (kenacort).

De behandeling duurt ongeveer tien minuten.

Na de behandeling

- Na afloop van de infiltratie voelt het gewricht wat stijf en opgeblazen aan. Dit gaat echter snel weer over.
- De pijnstillertje bupivacaine werkt ongeveer acht uur. De ontstekingsremmer kenacort begint pas na twee dagen te werken. Dit betekent dat u op de eerste dag na de behandeling nog klachten kunt hebben. Na twee dagen neemt de pijn af. De werking van de ontstekingsremmer houdt maximaal drie maanden aan. Keren de klachten binnen drie maanden na de behandeling terug, meld u dit dan op een vervolgspraak bij uw behandelend arts.

Belangrijk

- Bent u (mogelijk) zwanger, neemt u dan contact op met de afdeling Radiologie. In overleg met uw behandelend arts wordt de behandeling dan mogelijk uitgesteld.
- Bent u overgevoelig voor geneesmiddelen of jodium, vertelt u dit dan voor de behandeling aan de radiodiagnostisch laborant.
- De toediening van kenacort beïnvloedt de werking van een vaccin (bijvoorbeeld griepvaccin). Om deze reden mag de infiltratiebehandeling en een vaccinatie niet binnen een week van elkaar plaatsvinden.
- Als u bloedverdünnende medicijnen gebruikt, neemt u dan contact op met uw behandelend arts.
- Als u diabetes heeft, kan de infiltratiebehandeling leiden tot een tijdelijke hyperglycemie. Het advies is om de eerste twee dagen na de infiltratiebehandeling de glucosespiegels wat vaker te controleren en eventueel de dosis insuline tijdelijk te verhogen.

Vorbereiding

Er is geen specifieke voorbereiding nodig voor dit onderzoek.

Uitslag

U krijgt op de vervolgspraak met uw behandelend arts de uitslag van het onderzoek.

Vragen?

Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met onze afdeling via (076) 595 10 86.

Bent u verhinderd? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de afdeling Radiologie? Wij kunnen uw plaats dan voor een andere patiënt gebruiken.

Locatie

- Locatie Pasteurlaan
Pasteurlaan 9, Oosterhout
De afdeling Radiologie is op de begane grond, polikliniek nummer 22.