

Botox behandeling bij een hernia cicatricalis

Ter voorbereiding op een operatieve correctie van de buikwandbreuk, bent u door de chirurg verwezen naar de afdeling Pijngeneeskunde voor een botoxbehandeling. Het gaat om een behandeling met Botulinetoxine A, ook wel Botox genoemd. In deze folder leest u meer over de voorbereiding, uitvoering en de resultaten van de beotox behandeling.

Wat is een botox behandeling bij hernia cicatricalis?

Botuline toxine is een stof, welke wordt geproduceerd door een bacterie in gecontroleerde omstandigheden. Het is een natuurlijk eiwit. Deze stof kan spieren lokaal doen verslappen voor een bepaalde periode.

De botox wordt zo'n 4-6 weken voor de operatie ingespoten. Het betreft een poliklinische afspraak die ongeveer 30-45 minuten duurt.

Vorbereiding

Uw behandeld chirurg verwijst u voor deze behandeling door naar de anesthesioloog Pijnspecialist.

De afdeling Pijngeneeskunde informeert u over: de geplande datum, uw medicijnen en de afdeling waar u zich mag melden.

De behandeling

De anesthesioloog prikt onder echografie meerdere spierlagen in de buikwand aan. Er wordt een zoutoplossing ingespoten ter controle waarna de botox ingespoten wordt. De botox wordt meestal op twee of drie punten in de buikwandspieren ingespoten. De behandeling wordt over het algemeen zeer makkelijk verdragen.

Door het verslappende effect van de Botox ontspannen de samengetrokken schuine buikwandspieren. Dit zal de operatie voor uw behandeld chirurg soepeler doen verlopen. Daarnaast lijkt het gebruik van botox een gunstig effect te hebben op de pijnklachten na de operatie. Het is belangrijk om te weten voor u, dat de buikwandbreuk in de weken na de behandeling in omvang kan lijken toe te nemen. Dit is het gevolg van het verslappen van de spieren.

Bijwerkingen

De behandeling kan, ondanks onze zorgvuldige uitvoering, een aantal bijwerkingen met zich meebrengen:

- U kunt last krijgen van napijn. Deze kan enkele weken aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens bijsluiter). Zo nodig kan, in overleg met uw anesthesioloog pijnspecialist of huisarts, een andere pijnstiller worden voorgeschreven.
- Na de behandeling kan de huid op de behandelde plaats wat gevoeliger zijn of aanvoelen als een blauwe plek. Meestal is dit na een paar weken weer over. Sommige mensen houden hier langer last van.
- Allergische reactie op de gebruikte medicatie. U kunt dan tot 2 dagen na de behandeling last krijgen van jeuk, huiduitslag en mogelijke kortademigheid. Waarschuw in dit geval uw huisarts. Hij kan beoordelen welke behandeling noodzakelijk is.
- Krijgt u koorts, waarschuw dan uw anesthesioloog pijnspecialist of huisarts.

Belangrijk

- Draag makkelijk zittende kleding.
- Informeer uw anesthesioloog Pijnspecialist als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
- Als u bloedverdunners (antistollingsmedicatie) gebruikt, meld dit dan aan uw behandelend arts. Hij/zij bespreekt met u of en wanneer u moet stoppen met deze medicijnen.
- Uw andere medicijnen mag u blijven gebruiken zoals u gewend bent. Dit geldt ook voor uw pijnmedicatie.
- U bent ongeveer 1 à 2 uur in het ziekenhuis voor deze behandeling.

Leefregels

- Op de dag van de behandeling mag u niet actief deelnemen aan het verkeer.
- U kunt de dag na de behandeling uw activiteiten weer hervatten, tenzij de anesthesioloog Pijnspecialist iets anders met u heeft afgesproken.
- Het is belangrijk in bewegen te blijven waarbij u overbelasting probeert te vermijden.
- Het is altijd goed te stoppen met roken en te zorgen voor een lichaamsgewicht passend bij uw lengte.

Meer lezen over Pijngeneeskunde bij Amphia?

[Ga naar afdeling Pijngeneeskunde \(https://www.amphia.nl/afdelingen/pijngeneeskunde\)](https://www.amphia.nl/afdelingen/pijngeneeskunde)