

## Medicatiegebruik longfunctieonderzoek

### Inleiding

Om een longfunctieonderzoek goed uit te kunnen voeren is het soms noodzakelijk om te stoppen met medicatie.

Wanneer mag u medicatie niet innemen voor het onderzoek:

- U komt voor de eerste keer (zie uitzonderingen)
- U komt voor een histamineprovocatietest
- U komt voor een huidpriktest
- U komt voor een spirometrie voor en na inspanning

### Uitzonderingen:

Wanneer u **voor de eerste** keer komt mag u in de volgende gevallen uw **medicatie toch doorgebruiken**:

- U krijgt dit onderzoek als voorbereiding op een eventuele operatie
- U heeft een plekje op de longen dat verder onderzocht moet worden

In alle andere gevallen dient u wel te stoppen volgens de instructies in deze folder.

Leest u de informatie goed door.

Wanneer u medicatie wel heeft gebruikt kan het onderzoek niet doorgaan!

Hieronder staat beschreven welke medicatie u vooraf niet mag gebruiken en hoe lang u hiermee gestopt moet zijn voor het onderzoek. Daarboven wordt vermeld voor welke onderzoeken dit is.

Neem contact met ons op:

- Wanneer u vragen heeft of twijfelt of u moet stoppen met medicatie.
- Als het stoppen van de medicijnen problemen voor u oplevert.
- Als u andere medicijnen voor de longen gebruikt dan in de folder staan beschreven.

Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.30 uur op telefoonnummer 076 595 3030.

**Stoppen voor: Spirometrie/longfunctieonderzoek, histamineprovocatietest en spirometrie voor en na inspanning**

<b>6 uur van te voren niet inhaleren</b>	
<i>Werkzame stof/ generieke benaming</i>	<i>Merknaam</i>
<b>B-sympathicomimetica</b>	
Salbutamol	Airomir
	Ventolin
	Salamol (vernevelvloeistof)
Terbutaline	Bricanyl

<b>12 uur van te voren niet inhaleren</b>	
<i>Werkzame stof/ generieke benaming</i>	<i>Merknaam</i>
<b>Anticholinergica</b>	
Ipratropium	Atrovent
	Ipraxa (vernevelvloeistof)
<b>Duale bronchusverwijders</b>	
Fenoterol/Ipratropium	Berodual
Salbutamol/Ipratropium	Combivent
	Ipramol

<b>24 uur van te voren niet inhaleren</b>	
<i>Werkzame stof/ generieke benaming</i>	<i>Merknaam</i>
<b>B-sympathicomimetica</b>	
Formoterol	Atimos
	Foradil

<b>24 uur van te voren niet inhaleren</b>	
	Oxis
Salmeterol	Serevent
Indacaterol	Hirobriz
	Onbrez
Olodaterol	Striverdi
<b>ICS/LABA</b>	
Beclometason/Formoterol	Foster
Budesonide/Formoterol	Airbufo
	Bufoleer
	Duoresp
	Symbicort
<b>Fluticason</b>	
Budesonide/Salmeterol	Busalair
Flucatison/Salmeterol	Airfusol
	Salflutin
	Salfuler
	Seretide
Flucatison/Formoterol	Flutiform

<b>48 uur van te voren niet inhaleren</b>	
<i>Werkzame stof/ generieke benaming</i>	<i>Merksnaam</i>
<b>Anticholinergica</b>	
Acclidinium	Bretaris genuair
	Eklira genuair

<b>48 uur van te voren niet inhaleren</b>	
Tiotropium	Spriva
	Tavulus
	Tiotrus
Glycopyrronium	Seebri
	Tovanor
Umeclidinium	Incruse
<b>Duale bronchusverwijders</b>	
Formoterol/Aclidinium	Duaklir
Formoterol/Glycopyrronium	Bevespi
Indacaterol/Glycopyrronium	Ultibro
	Xoterna
Vilanterol/Umeclidinium	Anoro
Olodaterol/Tiotropium	Spiolto
<b>ICS/LABA</b>	
Fluticason furoaat/Vilanterol	Relvar
<b>ICS/LABA/LAMA</b>	
Beclometason/Formoterol/Glycopyrronium	Trimbow
	Trixeo
Flucatisation/umeclidinium/vilanterol	Trelegy ellipta
<b>Leukotriëenantagoïsten</b>	
Montelukast	Singulair

**Stoppen voor: Histamineprovocatietest, huidpriktest en spirometrie voor en na inspanning**

<b>Antihistaminicum 4 dagen van te voren niet innemen</b>	
---	--

<i>Werkzame stof/ generieke benaming</i>	<i>Merknaam</i>
Acrivastine	Semprex
Allergietabletten	
Azelastine	Allegodil
	Otrivinneusallergie
Cetirizine	Prevalin allerstop
	Reactine
	Zyttec
Chloorcyclizine/cinnarizine	Seebri
Cinnarizine	Cinnarizine
Clemastine	Tavigil
Desloratadine	Aerius
	Neoclarityn
Dimetideen	Fenistil
Ebastine	Kestine
Emedastine	Emadine
Fexofenadine	Allerga Fexotabs
	Telfast
Oxomemazine	Toplexil
Hooikoortstabletten	
Hydroxyzine	
Ketotifen (tablet en stroop)	Zaditen
Levocabastine	Livocab
Levocetirizine	Xyzal
Loratadine	Allerfree
Meclozine	Suprimal
Meclozine/Pyridoxine	Emesafene

Mizolastine	Mizollen
Olopatadine	Opatanol
Oxomemazine	Toplexil
Promethazine (tablet en stroop)	Phenergan
Rupatadine	Rupafin

**De volgende neusdruppels/ neussprays en oogdruppels mogen niet worden ingenomen op de dag van het onderzoek:**

<i>Werkzame stof/ generieke benaming</i>	<i>Merknaam</i>
Azelastine	Allegodil
	Otrivinneusallergie
Azelastine/ ?fluticason	Dymista
Emedastine	Emadine
Ketotifen	Altiabak
	Zaditen
Levocabastine	Livocab
Olopatadine	Opatanol

**Let op:** de volgende medicatie bevat ook antihistaminica, maar worden voor andere ziekten/aandoeningen worden gebruikt.

Ook hier geldt dat er **4 dagen vooraf gestopt** moet worden met deze medicatie om een goede, **betrouwbare** histamineprovocatietest of huidpriktest uit te kunnen voeren.

Maakt u zich hier zorgen over of kunt u niet stoppen met de beschreven medicatie, belt u dan met ons!

Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.30 uur op telefoonnummer 076 595 30 30.

<b>Ziekte/ aandoening</b>	<b>Werkzame stof/ generieke benaming</b>	<b>Merknaam</b>
<b>Hoest</b>	Oxomemazine	Toplexil
<b>Jeuk</b>	Hydroxyzine	Atarax

	Cimetidine	Tagamet
	Famotidine	Pepcid
		Pepcidin
<b>Misselijkheid</b>	Cyclizine	Marzine
<b>Reisziekte</b>	Cinnarizine	Cinnipirine
		Primatour
	Meclozine	Suprimal
	Cyclizine (zetpil)	Marzine

Voor een betrouwbare test vragen wij u contact met ons op te nemen in de volgende situaties:

Komt u voor een histamineprovocatietest of spirometrie voor en na inspanning:

- **Neem contact met ons op wanneer u in de afgelopen 6 weken de volgende soorten medicatie heeft gebruikt:**
  - (Extra) prednison
  - een antibioticakuur of
  - tricyclische antidepressiva:
    - Amitriptyline
    - Clomipramine
    - Imipramine
    - Maprotiline
    - Nortriptynine
    - Prothiaden
    - Sinequan

Belangrijk hierbij is dat u **niet stopt** met het gebruik van deze medicatie. Wel kan deze medicatie invloed hebben op de betrouwbaarheid van deze test. Daarom is het belangrijk om ons te laten weten dat u deze medicatie gebruikt.

Bel ons: Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur, op telefoonnummer 076 595 3030.

## Komt u voor de huidpriktest:

- **Neem contact met ons op wanneer u in de afgelopen 6 weken tricyclische antidepressiva heeft gebruikt:**
  - Amitriptyline
  - Clomipramine
  - Imipramine
  - Maprotiline
  - Nortriptynine
  - Prothiaden
  - Sinequan

Belangrijk hierbij is dat u **niet stopt** met het gebruik van deze medicatie. Wel kan deze medicatie invloed hebben op de betrouwbaarheid van deze test. Daarom is het belangrijk om ons te laten weten dat u deze medicatie gebruikt.

Bel ons: Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur, op telefoonnummer 076 595 3030.

## **Wel doorgebruiken**

De volgende middelen mogen gewoon door gebruikt worden, tenzij uw eigen arts anders heeft aangegeven:

<i>Werkzame stof/ generieke benaming</i>	<i>Merknaam</i>
Betamethason	Celestone
	Depo-Medrol
Dexamethason	Decadron
Hydrocortison	Hydro-dreson
Prednisolon	Di-Adreson
Triamcinolonacetonide	Albicort
	Ledercort
<b>Ontstekingsremmers</b>	
Beclometason	Aerobec
	Aldevin



	Becloforte
	Becotide
	Qvar
Ciclesonide	Alvesco
Fluticason	Flixotide
Budesonide	Pulmicort

### Heeft u nog vragen?

U kunt de polikliniek Longgeneeskunde bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.30 uur.  
U kunt ons bereiken via 076 595 30 30.

Meer lezen over longgeneeskunde bij Amphia?

[Ga naar afdeling Longgeneeskunde](https://www.amphia.nl/afdelingen/longgeneeskunde) (<https://www.amphia.nl/afdelingen/longgeneeskunde>)