

Leefregels na Mohs chirurgie

U heeft Mohs chirurgie met reconstructie ondergaan. Voor het herstel van de operatie is het belangrijk dat u zich thuis aan een aantal regels houdt.

Leefregels

- Niet bukken of tillen.
- U mag douchen, zorg dat de wond niet week wordt. Droog de wond deppend af.
- Houd het wondje schoon, eventueel kunt u schone steristrips plakken mochten deze erop zitten. (Die krijgt u me na de behandeling).
- Het is verstandig om met een extra kussen te slapen zodat u met uw hoofd wat hoger ligt.
- Mocht het nabloeden kunt u het beste met een schone zakdoek of een gaasje lichte druk op de wond geven gedurende 10 minuten.
- Bij pijnklachten mag u maximaal 4 maal daags 2 paracetamol van 500 mg innemen.

Als u veranderingen in het operatiegebied waarneemt van welke aard dan ook (toenemende pijnklachten, zwelling, bloeding etc.), neem dan contact op met:

Polikliniek van de plastische chirurgie
T (076) 595 2459

Buiten kantooruren met de spoedeisende hulp via de telefooncentrale
T (076) 595 5000.

Meer lezen over plastische chirurgie in Amphia?

[Ga naar afdeling Plastische Chirurgie](https://www.amphia.nl/afdelingen/plastische-chirurgie) (<https://www.amphia.nl/afdelingen/plastische-chirurgie>)