

## Leefregels na Mohs chirurgie met reconstructie door de plastisch chirurg

U heeft Mohs chirurgie met reconstructie ondergaan. Voor het herstel van de operatie is het belangrijk dat u zich thuis aan een aantal regels houdt.

### Leefregels

- Niet bukken of tillen.
- U mag douchen, zorg dat de wond niet week wordt. Droog de wond deppend af.
- Houd het wondje schoon, eventueel kunt u schone steristrips plakken mochten deze erop zitten. (Die krijgt u me na de behandeling).
- Het is verstandig om met een extra kussen te slapen zodat u met uw hoofd wat hoger ligt.
- Mocht het nabloeden kunt u het beste met een schone zakdoek of een gaasje lichte druk op de wond geven gedurende 10 minuten.
- Bij pijnklachten mag u maximaal 4 maal daags 2 paracetamol van 500 mg innemen.

Als u veranderingen in het operatiegebied waarneemt van welke aard dan ook (toenemende pijnklachten, zwelling, bloeding etc.), neem dan contact op met de polikliniek plastische chirurgie.

Meer lezen over plastische chirurgie in Amphia?

[Ga naar afdeling Plastische Chirurgie \(https://www.amphia.nl/afdelingen/plastische-chirurgie\)](https://www.amphia.nl/afdelingen/plastische-chirurgie)