

Prednisolon Prednison Prednisolon/Prednison

Inleiding

Prednisolon wordt ingezet bij de Ziekte van Crohn of colitis ulcerosa.

Deze folder is geen vervanging van de bijsluiter.

Prednisolon

Prednisolon is een ontstekingsremmend medicijn, wat werkt bij buikpijn en diarree. Het is een geneesmiddel waarvan het effect snel merkbaar is, vaak al na 24 uur. Soms duurt het echter wat langer. Prednisolon wordt onder meer gegeven bij een opleving van de Ziekte van Crohn of colitis ulcerosa, omdat andere medicijnen niet direct werken. Prednisolon wordt vaak in combinatie met andere geneesmiddelen gegeven.

Gebruik

Prednisolon bestaat in tabletvorm, maar kan ook in de bloedvaten geïnjecteerd worden. Dit laatste gebeurt alleen in het ziekenhuis. Neem de tabletten bij voorkeur vóór of tijdens de maaltijd in met melk of water. De voorgeschreven dosering prednisolon dient exact te worden opgevolgd.

Prednisolon is een corticosteroïde. Dit is een bijnierschorshormoon dat kunstmatig gemaakt wordt en de eigen bijnier gaat hierdoor minder functioneren. Bij langdurig gebruik van prednisolon, zal de MDL-arts de dosering langzaam afbouwen, om eventuele bijwerkingen te voorkomen. Uw eigen bijnier kan dan geleidelijk de productie van de hormonen weer overnemen. Verminder of stop daarom nooit met het gebruik van prednisolon, maar overleg altijd met uw MDL-arts (Maag-, Darm- en Leverziekten).

Bijwerkingen

De bijwerkingen zijn afhankelijk van de dosering en duur van het gebruik.

- Voller worden in het gezicht;
- Vocht vasthouden of dikke enkels;
- Gewichtstoename (verdwijnt bij verminderen medicijn);
- Toename van de eetlust (verdwijnt bij verminderen medicijn);
- Botontkalking;
- Maagklachten (bijvoorbeeld in combinatie met bepaalde pijnstillers en bloedverduunners);
- Vertraagde wondgenezing;

- Dunnere huid en snel blauwe plekken;
- Stemmingsveranderingen, depressie, slapeloosheid;
- Verhoogde infectiekans;
- Ontregeling van diabetes;
- Verhoogde bloeddruk

Neem bij maagklachten, bloedverlies of zwarte ontlasting direct contact op met een arts. Eventueel kan ter voorkoming van de bijwerkingen een maagbeschermer voorgeschreven worden. Dit is afhankelijk van andere medicijnen die u gebruikt.

Ziekte of operatie

Stel bij operatieve ingrepen, koorts of ziekte altijd de arts op de hoogte van het gebruik van prednisolon. Mogelijk moet de dosering tijdelijk aangepast worden.

Zwangerschap

Prednison kan veilig gebruikt worden tijdens de zwangerschap en bij borst-voeding. Mocht u een zwangerschapswens hebben, overleg dan met uw behandelend MDL-arts of verpleegkundig specialist MDL. Eventueel kan de dosering aangepast worden.

Vaccinatie

Gebruik prednisolon niet wanneer u de afgelopen twee weken bent ingeënt tegen de mazelen, rode hond of de bof. Raadpleeg de MDL-arts, de verpleegkundig specialist MDL of apotheker als u gevaccineerd bent.

Belangrijk

- Houdt u zich aan de voorgeschreven dosis en verander deze nooit op eigen initiatief.
- Vragen over uw medicijnen, raadpleeg de apotheker.
- Last van bijwerkingen: Licht altijd uw MDL-arts of verpleegkundig specialist MDL in.
- Bespreek aanpassing van medicatie altijd met de MDL-arts of verpleegkundig specialist MDL.
- Stop niet zelf met de behandeling.

Problemen

Problemen en klachten kunt u bespreken tijdens een controlebezoek, of neem contact op met uw huisarts. De huisarts kan indien nodig met de behandelend arts overleggen. Ook is een telefonisch overleg met de Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) mogelijk.

Vragen?

Voor vragen of meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de MDL-arts of de verpleegkundig specialist MDL. Ook kunt u mailen met de verpleegkundig specialist MDL: npmdl@amphia.nl (<mailto:npmdl@amphia.nl>). Vermeld hierbij altijd uw geboortedatum of patiëntnummer.

Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL)

Locatie Molengracht

Telefoonnummer: (076) 595 50 71

Meer lezen over maag-, darm- en leverziekten in Amphia?

[Ga naar afdeling MDL](https://www.amphia.nl/afdelingen/mdl) (<https://www.amphia.nl/afdelingen/mdl>)