

Nazorginstructie na Mohs Chirurgie

U bent vandaag door dokter:

- _ mw. S.J. Caers
- _ mw. dr. D.I.M. Kuijpers
- _ mw. dr. L.C. Jacobs
- _ B. Prens
- _ L.C.C. Wijne

poliklinisch geopereerd aan:

- _ Basaalcelcarcinoom
- _ Plaveiselcelcarcinoom

Hiervoor krijgt u de onderstaande instructies voor de eerste dagen na de behandeling:

1. Wondbehandeling

- _ Het drukverband en de pleister laten zitten
- _ U mag het drukverband en de pleister indien nodig na drie dagen vervangen door een eigen pleister. De hechtstrip moet blijven zitten todat de hechtingen verwijderd worden.
- _ Na drie dagen mag u douchen
- _ U dient de operatiewond droog te houden
- _ Na drie dagen wondcontrole: locatie.....

2. Pijnbestrijding

Bij pijn mag u 2 tabletten paracetamol van 500mg innemen met een maximum van 8 tabletten per dag.

3. Overig

- _ De eerste week kunt u beter niet sporten
- _ Niet te zwaar tillen
- _ Niet naar voren bukken
- _ Tijdelijk met een extra kussen slapen of verhoogd hoofdeinde
- _ U wordt morgen door de assistente van de polikliniek dermatologie gebeld.

4. Bij problemen

Lichte lekkage van bloed of wondvocht door de pleister heen is mogelijk.

Alleen de aangekruiste instructies gelden voor u.