

Longgeneeskunde: medicatielijst voor onderzoek

Binnenkort verwachten wij u op de Longfunctieafdeling van Amphia (Molengracht of Pasteurlaan) voor één of meerdere Longfunctieonderzoeken.

Mag u uw medicijnen innemen vóór het onderzoek

Komt u voor de eerste keer, dan dient u uw medicatie te stoppen zoals in onderstaand schema is aangegeven. Komt u voor een reguliere controle, dan blijft u uw medicatie doorgebruiken, tenzij de specialist heeft aangegeven dat u uw medicatie moet stoppen, volgt u dan het onderstaande schema. Voor de histamineprovocatietest zult u uw medicatie zoals hieronder is aangegeven (voor- en achterkant) altijd moeten stoppen.

Longfunctie + histamineprovocatietes

6 uur van te voren niet inhaleren:

B-sympathomimimetica:

Salbutamol	Airomir, Ventolin
Terbutaline	Bricanyl
Fenoterol	Berotec
Rimiterol	Pulmadil

Anticholinergica:

Ipratropium	Atrovent, Ipraxa
-------------	------------------

Duale bronchusverwijders:

Fenoterol/Ipratropium	Berodual
Salbutamol/Ipratropium	Combivent, Ipramol

12 uur van te voren niet inhaleren:

B-sympothicomimimetica:

Formoterol	Atimos, Foradil, Oxis
Salmeterol	Serevent
Theofylline	theolair, theolin unilair

24 uur van te voren niet inhaleren:

B-sympathomimetica:

Indacaterol	Onbrez
Olodaterol	Striverdi

Anticholinergica:

Tiotropium	Spiriva, Tiotrus
Glycopyrronium	Seebri
Umeclidinium	Incruse

Duale bronchusverwijders:

Indacaterol/Glycopyrronium	Ultibro
Vilanterol/Umeclidinium	Anoro
Olodaterol/Tiotropium	Spiolto

ICS/LABA:

Fluticason furoaat/Vilanterol	Relvar
-------------------------------	--------

ICS/LABA/LAMA:

Fluticason/Umeclidinium/Vilanterol	Trelegy
Beclometason/Formoterol/Glucopyrronium	Trimbow

24 uur van te voren stoppen:

Leukotriënantagonisten:

Montelukast

Singulair

Histamineprovocatietest en huidpriktest

Acrivastine	Semprex	Levocabastine	Livocab
Alimemazine	Nedeltran	Levocetizine	Xyzal
Azelastine	Allergodil, Otrivinneusallergie	Loratadine	Allerfre, Claritine
Cinnarizine	Cinnipirine	Mebhydroline	Incidal
Cinnarizine/chloorcyclizine	Primatour	Meclozine	Suprima
Cimetidine	Tagamet	Meclozine/pyridoxine	Emesafe
Clemastine	Tavigil	Mizolastine	Mizollen
Cetizine	Zyrtec, Prevalin Allerstop, Reactine	Montelukast Nizatidine	Singulair Axid
Cyclizine	Marzine	Olopatadine	Opatanc

Cyproheptadine Desloratadine	Periactin	Oxatomide Oxomemazine	Tinset
Dexchlorfeniramine	Aerius, Neoclarityn Polaramine	Promethazine	Phenergan
Dimenhydrinaat	Dramamine	Ranitidine	Zantac
Dimetindeen	Fenistil	Ranitidinebismutcitraat	Pylorid
Ebastine	Kestine	Rupatadine	Rupafin
Emedastine Fexofenadine Famotidine	Emadine Telfast Pepcid, Pepcidin	Terfenadine	Triludan
Guaifenisine/Natriumbenzoaat/ Oxomemazine	Toplexil Atarax		
Hydroxyzine Ketotifen	Zaditen, Altrabak		

Huidpriktest

De volgende neusdruppels/oogdruppels stoppen op de dag van de test:

Azelastine	Allergodil, Otrivinneusallergie
Emedastine	Emadine
Ketotifen	Zaditen, Altrabak
Levocabastine	Livocab
Olopatadine	Opatanol

1 week van te voren staken:

Betamethason	Celestone, Depo-Medrol
Dexamethason	Decadron
Hydrocortison	Hydro-dreson
Prednisolon	Di-Adreson
Triamcilon	Ledercort
Triamcinolonacetonide	Albicort

ontstekingsremmers

Beclometason	Aerobec, aldevin, alvesco, becloforte, becotide, Qvar
fluticason	flixotide
budesonide	pulmicort