

## Bloedverdunners rondom ingreep, behandeling of onderzoek

Naam:

Geboortedatum:

MDN:

Ingreep/ onderzoek:

(Voorlopige) datum ingreep/ onderzoek:

### Inleiding

U ontvangt deze folder omdat u binnenkort een ingreep, behandeling of onderzoek in Amphia krijgt en u bloedverdunners (antistollingsmiddelen) gebruikt. Deze middelen zorgen ervoor dat u minder kans heeft op het krijgen van bloedstolsels in uw bloedvaten (trombose).

In deze folder kunt u lezen hoeveel dagen voor de, ingreep, behandeling of het onderzoek u moet stoppen met uw bloedverdunners. Of dat u uw bloedverdunner juist door moet gebruiken.

Na de ingreep, behandeling of het onderzoek begint u weer met de bloedverdunner(s). Uw arts bespreekt wanneer u weer mag beginnen. Gebruikt u Acenocoumarol of Fenprocoumon? U krijgt een doseerschema voor het beginnen met deze bloedverdunners.

### Belangrijk!

Bij veranderingen in het gebruik van uw bloedverdunners moet u altijd contact op te nemen met uw behandelend arts. Als u een medicijnrol heeft (ook wel baxterrol) moet u aan uw apotheek de datum van uw ingreep/ behandeling onderzoek doorgeven.

**Soort bloedverdunner:**

**Dit moet u doen:**

? Doorgaan

? 3 dagen voor ingreep/behandeling/onderzoek

? 3 dagen voor ingreep/behandeling/onderzoek  
spuitjes met kortwerkende bloedverdunner (N)

*\*doorhalen wat niet van toepassing is*

Acenocoumarol

? Anders, namelijk ...

**Belangrijk!** Geef aan uw trombosedienst door  
ingreep/behandeling/onderzoek krijgt waarvoor  
moeten worden. Neem uw doseerschema van  
ziekenhuis.

## VKA - Vitamine K-antagonisten

? Doorgaan

? 5 dagen voor ingreep/behandeling/ onderzoek

? 5 dagen voor ingreep/behandeling/ onderzoek  
spuitjes met kortwerkende bloedverdunner (N)

Fenprocoumon

*\*doorhalen wat niet van toepassing is*

? Anders, namelijk ...

**Belangrijk!** Geef aan uw trombosedienst door  
ingreep/behandeling/onderzoek krijgt waarvoor  
moeten worden. Informeer uw trombosedienst  
doseerschema van de trombosedienst mee met

## DOAC - Directe orale anticoagulantia

Dabigatran

(Pradaxa®)

?Doorgaan

? 1/ 1,5/ 2/ 3/ 4\* dag(en) voor ingreep/behandeling

*\*doorhalen wat niet van toepassing is*

? Anders, namelijk ...

<p>Apixaban (Eliquis®)/ Rivaroxaban (Xarelto®)</p>	<p>? Doorgaan</p> <p>? 1/ 1,5/ 2* dag(en) voor ingreep/behandeling/onderzoek stoppen</p> <p><i>*doorhalen wat niet van toepassing is</i></p> <p>? Anders, namelijk ...</p>	
<p>Edoxaban (Lixiana®)</p>	<p>? Doorgaan</p> <p>? 1/ 2* dag(en) voor ingreep/behandeling/onderzoek stoppen</p> <p><i>*doorhalen wat niet van toepassing is</i></p> <p>? Anders, namelijk ...</p>	
<p><b>LMWH – Low Moleculair Weight Heparine</b></p>	<p>Nadroparine (Fraxiparine®)</p>	<p>? Doorgaan</p> <p>? 12/ 24* uur voor ingreep/behandeling/onderzoek stoppen</p> <p><i>*doorhalen wat niet van toepassing is</i></p> <p>? Anders, namelijk ...</p>
	<p>Enoxaparine</p>	<p>? Doorgaan</p> <p>? 12/ 24* uur voor ingreep/behandeling/onderzoek stoppen</p> <p><i>*doorhalen wat niet van toepassing is</i></p> <p>? Anders, namelijk ...</p>

<b>Pentasaccharide</b>	Fondaparinux (Arixtra®)	? Doorgaan ? 36 uur voor ingreep/behandeling/onderzoek ? Anders, namelijk ...
	Acetylsalicylzuur, carbasalaatcalcium	? Doorgaan ? 5 dagen voor ingreep/behandeling/onderzoek ? Anders, namelijk ...
	Dipyridamol	? Doorgaan ? 1 dag voor ingreep/behandeling/onderzoek ? Anders, namelijk ...
<b>TAR - Trombocytenaggregatieremmers</b>	Clopidogrel (Grepid, Plavix®)	? Doorgaan ? 5 dagen voor ingreep/behandeling/onderzoek ? 5 dagen voor ingreep/behandeling/onderzoek acetylsalicylzuur 80mg 1dd ? Anders, namelijk ...
	Prasugrel (Efient®)	? Doorgaan ? 7 dagen voor ingreep/behandeling/onderzoek ? Anders, namelijk ...
	Ticagrelor (Brilique®)	? Doorgaan ? 5 dagen voor ingreep/behandeling/onderzoek ? Anders, namelijk ...