

Pulmonaal-Vene-Ablatie

PVI CRYO

De cardioloog heeft met u besproken dat u in aanmerking komt voor een PVI CRYO ablatie procedure.

U bent bekend met boezemfibrilleren en het doel van deze behandeling is deze hartritmestoornis te stoppen. Boezemfibrilleren ontstaat vaak in het gebied rondom de longaders, dat zijn de 4 bloedvaten van de longen die uitmonden in de linkerboezem van het hart. Tijdens deze behandeling zal de cardioloog d.m.v. bevroering (CRYO) het gebied rondom deze bloedvaten behandelen. Dit doet de cardioloog door het plaatsen van een ballonnetje in de linkerboezem van uw hart. Hij blaast dit op en koelt het tot een temperatuur van -50 graden. Er ontstaat dan littkekenweefsel, wat ervoor zorgt dat de prikkelgeleiding geblokkeerd wordt. Boezemfibrilleren wordt daardoor voorkomen.

Hieronder de belangrijkste zaken op een rij.

Antistolling

Indien u medicatie gebruikt waarvoor u naar de trombosedienst gaat, dient u deze medicatie **ten minste 6 weken voorafgaande aan de behandeling** in te nemen volgens normale dosering. Het gaat dan om:

- acenocoumarol (Sintrom Mitis)
- fenprocoumon (Marcoumar)

Ook **NOAC** of **DOAC** moet u doorgebruiken, zo **óók innemen op de ochtend van de ablatiebehandeling**.

Onder NOAC of DOAC wordt verstaan:

- apixaban (Eliquis);
- dabigatran (Pradaxa);
- rivaroxaban (Xarelto);
- edoxaban (Lixiana).

N.B: Indien u deze medicatie niet volgens voorschrift heeft ingenomen, kan de behandeling niet doorgaan! Het risico op complicaties is voor u dan te groot. Mochten er problemen zijn met de inname van deze medicijnen, bespreekt u dit dan dit s.v.p. tijdig met de ICD-verpleegkundige.

Dag van behandeling

- Nuchter na 00.00 uur als u vóór 10.00 uur wordt opgenomen;

- Licht ontbijt (twee beschuiten met jam en thee) als u ná 10.00 uur wordt opgenomen;
- Dag van behandeling niet insmeren met bodylotion, daar ECG-stickers dan niet plakken;
- Geen nagellak op vingernagels;
- INR laten prikken, voordat u naar de afdeling gaat. (Lab formulier ophalen bij receptie);
- Inuus prikken op verpleegafdeling;
- Hartfilmpje (ECG) laten maken op verpleegafdeling.

Contra indicaties

U komt (tijdelijk) niet in aanmerking voor een PVI Cryo ablatie als u:

- overgevoelig bent voor Heparine;
- infecties heeft met koorts;
- recent (< 12 weken) een hartinfarct heeft gehad.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met de ICD-verpleegkundige.

- Telefonisch spreekuur: Tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag) tussen 11.00-12.00 uur.
Telefoonnummer: (076) 595 30 36
- Email: ICDverpleegkundigen@amphia.nl(mailto:ICDverpleegkundigen@amphia.nl)

Meer lezen over het hartcentrum bij Amphia?

[Ga naar Het Hartcentrum](https://www.amphia.nl/afdelingen/hartcentrum) (<https://www.amphia.nl/afdelingen/hartcentrum>)