

Voedingssonde in het duodenum

Wanneer u een obstructie heeft in uw slokdarm of maag, kunnen we een duodenumsonde plaatsen. Dit is hetzelfde als een maagsonde, alleen wordt de duodenumsonde met een endoscoop dieper in uw maag-darmkanaal ingebracht. Een endoscoop is een dunne, flexibele slang met een camera.

Vorbereiding

Het plaatsen van de duodenumsonde gebeurt met een endoscoop. Een roesje is in de meeste gevallen niet nodig. Het plaatsen van de sonde duurt ongeveer tien minuten. Het is belangrijk dat u voor deze behandeling nuchter bent.

Vaak kan iemand die een voedingssonde krijgt niet via de normale weg eten. Daarom is het belangrijk dat we niet te lang wachten met het plaatsen. Soms kiezen we er toch voor om een dag te wachten.

Onderzoek

Eerst snuift u een gel op die uw neus verdooft. Daarna brengen we via uw neus een dunne endoscoop in. Daardoorheen komt een voerdraad. De endoscoop wordt dan teruggetrokken en de voerdraad blijft zitten. Over deze voerdraad schuift de arts de sonde tot aan het begin van uw dunne darm (duodenum). De arts trekt vervolgens de voerdraad eruit en plakt het slangetje op uw neus vast met een pleister.

Uitslag

Als de sonde geplaatst is, mag u vaak meteen weer naar huis. Let er thuis goed op dat de duodenumsonde niet verstopt raakt. Spoel deze na iedere voeding ruim door met water. Een diëtiste bespreekt met u welke voeding u door de sonde mag gebruiken en hoeveel u daarvan mag nemen.

Lees meer over de afdeling Maag- Darm en Leverziekten bij Amphia.

[Ga naar de afdeling MDL](https://www.amphia.nl/afdelingen/mdl) (<https://www.amphia.nl/afdelingen/mdl>)