

Belangrijke informatie betreft derde vaccinatie voor specifieke groep mensen met MS.

Derde prik voor specifieke groep mensen met MS

Op basis van onder andere dit voorlopige onderzoek heeft de Gezondheidsraad daarom aan de Minister van VWS geadviseerd om een specifieke groep mensen met een ernstige afweerstoornis toch een derde vaccinatie aan te bieden. Het gaat om de groep patiënten die na twee vaccinaties onvoldoende antistoffen hebben opgebouwd tegen COVID-19; zij zijn daardoor mogelijk niet goed beschermd. Bij hen kan een derde vaccinatie de bescherming verbeteren. De Minister van VWS neemt dit advies over. Tot deze groep behoren mensen met MS die behandeld worden met de volgende afweer-onderdrukkende medicijnen: **fingolimod, siponimod, ozanimod, ocrelizumab, rituximab of ofatumumab.**

Zij ontvangen op korte termijn een oproep.

Bij de meeste mensen met MS werkt het vaccin goed

De derde prik wordt dus alleen geadviseerd aan een specifieke groep patiënten. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat twee vaccinaties tegen COVID-19 bij mensen met MS goed werken. Op dit moment doen ruim 3000 deelnemers mee aan de studie. Op basis van de resultaten van de eerste 1500 deelnemers concluderen de onderzoekers dat het merendeel van mensen met MS beschermende antilichamen hebben aangemaakt na de tweede prik. Daarmee verschillen ze niet of nauwelijks van gezonde mensen die gevaccineerd zijn.

Bron; <https://msresearch.nl/nieuws/ms-covid-vaccinatie-wel-of-geen-derde-prik>

Aanvullende informatie vind u op de volgende websites van het RIVM;

<https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/immuungecompromitteerden>